

ПРОТОКОЛ № 2

**Расширенного заседания научно-методического
семинара кафедры Общей биологии и технологии ее обучения**

от 4 ноября 2019г

Явочный лист прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Недержание мочи у женщин (докладчик доцент кафедры урологии КРСУ
Алимов Ч.Б.)**

**1. По первому вопросу выступил докладчик Ч.Б.Алимов
(Доклад прилагается)**




ВОПРОСЫ:

1. Чоров М.Ж. Расскажите этиологию этого заболевания?

ОТВЕТ- Многократные или осложненные роды, ожирение, хронические воспалительные заболевания органов малого таза, операции на органах малого таза, занятия тяжелой атлетикой и некоторыми другими видами спорта могут изменять нормальное анатомическое взаиморасположение тазовых органов и влиять на порог чувствительности нервных рецепторов. Следствием изменений в мочевыводящем канале, мочевом пузыре, связках и фасциях тазового дна становится недержание мочи.


2. Каниметов Э.Ж- Как диагностируются это заболевание?

ОТВЕТ- Собирают жалобы пациентов, подробный анамнез развития недержания. Пациент заполняет дневник мочеиспусканий, в котором отражается объем и частота мочеиспусканий. При недержании мочи у женщин большое диагностическое значение приобретает консультация гинеколога с проведением гинекологического осмотра, во время которого выявляется цистоцеле, опущение матки и влагалища. Проводится кашлевый тест (при выраженном опущении матки и передней стенки влагалища тест иногда бывает отрицательным; в таком случае предполагается возможная скрытая форма недержания мочи). Для точного определения потерь мочи проводится прокладочный тест.



3. Акматов М.К- Какое лечение применяется?

ОТВЕТ - Наше время недержание мочи лечится как консервативно (медикаментозная и немедикаментозная терапия), так и оперативно. Терапевтическая методика подбирается урологом индивидуально после детального обследования пациента, определения причин и степени недержания мочи. Показанием к хирургическому лечению недержания мочи является неэффективность или недостаточный эффект консервативной терапии. В большинстве случаев хорошего результата при лечении недержания мочи удастся достигнуть консервативными методами. При недостаточной эффективности или отсутствии эффекта от медикаментозной и немедикаментозной терапии проводится оперативное лечение недержания мочи. Операционная тактика определяется в зависимости от формы недержания мочи и результатов предшествующего консервативного лечения. Операция чаще требуется пациентам со стрессовым и парадоксальным недержанием мочи, реже – больным, страдающим ургентным недержанием мочи.



4. Давлетова Ч.С. –Болеют ли мужчины недержанием мочи?

ОТВЕТ- многие мужчины болеют и лечатся

ВЫСТУПИЛИ:

Шаршеналиева Г.А. - Мы многое узнали о выделительной системе женского организма. Очень многие женщины страдают этой патологией.

Тема научно-методического семинара взаимосвязано с предметами профессионального цикла (Анатомия и морфология человека, Физиология человека и животных) направлений 520200 «Биология»;550100 «Естественнонаучного образования», профиль – Биология. Мы получили очень интересную информацию. Большое спасибо, что пришли сделали интересный доклад.



Чоров М.Ж.- Спасибо за такую информацию. Мы желаем вам крепкого здоровья и успехов в работе. Я думаю это наша не последняя встреча.